

RETNINGSLINJER FOR RØNTGENOPPTAK

Det skal foreligge full røntgenstatus (intraorale bilder) av alle pasienter som skal ha eller vurderes for systematisk periodontittbehandling. Alle approximal områder og røtter må være godt friprojisert for at en fullgod vurdering skal kunne gjøres. OPG er ikke tilstrekkelig.

Retningslinjer for nye røntgenopptak:

Grunner til opptak av <u>ny</u> full status:	Grunner til enkeltopptak:
<p><i>Pasientrelatert:</i></p> <p>Vurdering – utvikling og prognose</p> <p>Klinisk undersøkelse viser residiv/behov for ny periodontittbehandling.</p>	<p><i>Diagnostisk hensikt:</i></p> <p>Diagnose/differensialdiagnose (akutte situasjoner)</p> <p>Sinusbilder</p> <p>Retinerte tenner</p>
<p><i>Undervisningsrelatert:</i></p> <p>Vurdering av behandlede kasus - 5 år eller mer etter ferdigbehandlet.</p>	<p><i>Etterkontroll etter utført behandling:</i></p> <p>Implantat-behandling</p> <p>Styrt vevsregenerasjonsprosedyre</p> <p>Endobehandling (endo/perio)</p> <p>Spesielle problemområder</p>
<p><i>Dokumentasjonsrelatert:</i></p> <p>Avansert behandling, utført på videreutdannelsen.</p> <p>Ny status 1 år eller mer etter avsluttet behandling (eksamens dokumentasjon).</p>	<p><i>Spesielle opptak:</i></p> <p>OPG</p> <p>CT-scan</p> <p>Vurdering for implantat</p>